

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Мифегин 200 mg, таблетки
активно вещество: мифепристон

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Мифегин и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Мифегин
3. Как да приемате Мифегин
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Мифегин
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20 120578
Разрешение №	29292 / 08-05-2015
Одобрение №	/

1. Какво представлява Мифегин и за какво се използва

Таблетките Мифегин съдържат мифепристон, който представлява антихормон, който действа чрез блокиране на ефектите на прогестерон – хормонът, необходим за продължаване на бременността. Следователно Мифегин може да предизвика прекъсване на бременността. Той може да се използва също и за размекване и отваряне на входа (шийката) на утробата (матката).

Мифегин се препоръчва за използване:

- 1) За медикаментозно прекъсване на бременност:
 - не по-късно от 63 дни, считано от първия ден на Вашата последна менструация,
 - в комбинация с друго лекарство, простагландин (вещество, отключващо контракциите на матката и размекващо шийката), което се прилага от 36 до 48 часа след приемането на Мифегин.
- 2) За размекване и отваряне на шийката на матката преди хирургично прекъсване на бременността по време на първите три месеца.
- 3) Като подготвително лечение преди прилагане на простагландини за прекъсване на бременност по медицински причини след 3-ия месец на бременността.
- 4) За предизвикване на родова дейност в случаи, при които зародишът е умрял вътре в матката и когато не е възможно да се приложи лечение с други лекарства (простагландин или окситоцин).

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Мифегин

Не приемайте Мифегин:

- При всички случаи,



