

Превенция на срастванията след гинекологични операции



Кратка информация за медицинското изделие

Hyalobarrier gel® е стерил и силно вискозен гел, който се получава чрез кондензация на хиалуроновата киселина, един от главните елементи на човешката съединителна тъкан и епителните и мезотелиалните тъкани. Състои се от 100 % чиста хиалуронова киселина, без примеси от каквито и да било други вещества. Благодарение на своя вискозитет може чудесно да прилепне към повърхността на тъканите и към коремната стена. Така образува бариера срещу срастванията, която държи прилежащите тъкани на разстояние една от друга през фазата на зарастване, която следва след хирургическа намеса. Затова индикациите му са за превенция или намаляване на образуването на следоперативни сраствания в областта на корема, таза и маточната кухина (например отстраняване на миоми, ендометриоза, кисти на яйчниците, операции на маточните тръби, сраствания в маточната кухина, раждане с цезарово сечение).

Гелът се разгражда изцяло до 4 седмици след приложението му по пътя на естествения метаболизъм на хиалуроновата киселина.

Опаковка: предлагат се две различни форми:

Hyalobarrier gel®: показан е за прилагане при открити хирургични интервенции (лапаротомия) и при цезарови сечения

Hyalobarrier gel® endo: показан е за използване при ендоскопски интервенции (лапароскопия, хистероскопия)

Съхранение: Трябва да се съхранява в хладилник при температура 2–8°C. Не бива да замръзва!

Производител: ANIKA THERAPEUTICS S.r.l., ИТАЛИЯ

Hyalobarrier gel® може да се закупи без рецепта от всяка аптека по предварителна заявка (за справка Инфофарма, раздел "Медицински изделия") или чрез вносителя за България – Новус ЕООД

NORDIC
PHARMA

Вносител за България: **Новус ЕООД**
София 1463, ПК 147, тел: +359 888912674, office@novus.bg, www.novus.bg

www.srastvania.bg

Предстои ли ви раждане с цезарово сечение?



Hyalobarrier® gel


превенция на образуването на постоперативни сраствания

Посъветвайте се със своя лекар

www.srastvania.bg

Знаете ли, че...

при раждане с цезарово сечение можете да бъдете застрашена от т. нар. **сраствания**?



Срастване

Знаете ли, че...

срастванията са аномални свързвания между тъканите и органите?

Знаете ли, че...


сраствания се образуват до 3–5 дни след операцията?

Знаете ли, че...

срастванията могат да усложнят или да направят **невъзможно следващо забременяване**?

Знаете ли, че...

тези сраствания могат да Ви причинят **хронична болка в корема**?



Знаете ли, че...

съществува превенция на появата на срастванията?



Знаете ли, че...

съществуват т. нар. **средства против сраствания** (гелове), които могат да се прилагат в мястото на нараняване на тъканите в края на операцията (оперативното раждане с цезарово сечение) и така механично да предотвратят възникването на сраствания.

Знаете ли, че...

Hyalobarrier се състои от 100% хиалуронова киселина, която остава на мястото на апликацията 7 дни, след което се реабсорбира, а до 1 месец се разгражда изцяло по пътя на естествения метаболизъм.

Знаете ли, че...

Hyalobarrier gel е медицинско изделие, което пациентката може преди операцията да си купи от аптеката и да донесе в болницата за операцията. За хирургическо раждане с цезарово сечение **се препоръчва Hyalobarrier gel с 5 cm канюла за апликация.**

Посъветвайте се със своя лекар