

Знаете ли, че...

най-честите усложнения след операция в областта на корема и таза са **срастванията** ?

Знаете ли, че...


срастванията са аномални свързвания между тъканите и органите?

Знаете ли, че...

срастванията възникват както след хирургични операции, така и след възпаления? (възпаления на яйчниците, ендометриоза...)?

При кои операции сте най-застрашена от сраствания?

- ▶ операция на миоми на матката
- ▶ операция по повод на ендометриоза
- ▶ операция на яйчниците (кисти), на маточните тръби
- ▶ премахване на вече възникнали сраствания
- ▶ цезарово сечение (оперативно раждане)
- ▶ кюртаж на матката
- ▶ хирургични операции на червата (сляпо черво), на жлъчката...



срастване

Какво могат да Ви причинят срастванията?

- ▶ безплодие (инфертилитет)
- ▶ хронични коремни болести
- ▶ нарушаване на проходимостта на червата (вкл. запек)
- ▶ болезнен полов акт
- ▶ болезнена менструация
- ▶ многократни операции за отстраняване на срастванията и по-други поводи
- ▶ нееднократно хоспитализиране и нетрудоспособност

Могат ли да се предотвратят срастванията? **ДА**

- ▶ съществуват т. нар. бариерни (предотвратяващи образуването на сраствания) медицински изделия (например Hyalobarrier gel), които се прилагат в хода на операцията и механично предотвратяват **образуването на сраствания.**

Сраствания



Премахване на срастванията

Матка Маточна тръба



Прилагане на Hyalobarrier gel на мястото



Зараснала тъкан без сраствания на мястото на приложение на гела

## Превенция на срастванията след гинекологични операции



### Кратка информация за медицинското изделие

**Hyalobarrier gel®** е стерилен и силно вискозен гел, който се получава чрез кондензация на хиалуроновата киселина, един от главните елементи на човешката съединителна тъкан и епителните и мезотелиалните тъкани. Състои се от 100 % чиста хиалуронова киселина, без примеси от каквито и да било други вещества. Благодарение на своя вискозитет може чудесно да прилепне към повърхността на тъканите и към коремната стена. Така образува бариера срещу срастванията, която държи прилежащите тъкани на разстояние една от друга през фазата на зарастване, която следва след хирургическа намеса. Затова индикациите му са за превенция или намаляване на образуването на следоперативни сраствания в областта на корема, таза и маточната кухина (например отстраняване на миоми, ендометриоза, кисти на яйчниците, операции на маточните тръби, сраствания в маточната кухина...). Гелът се разгражда изцяло до 4 седмици след приложението му по пътя на естествен метаболизъм на хиалуроновата киселина.

**Опаковка:** предлагат се две различни форми:

**Hyalobarrier gel®:** показан е за прилагане при открити хирургични интервенции (лапаротомия)

**Hyalobarrier gel® endo:** показан е за използване при ендоскопски интервенции (лапароскопия, хистероскопия)

**Съхранение:** Трябва да се съхранява в хладилник при температура 2–8°C. Да не се замразява!

**Производител:** ANIKA THERAPEUTICS S.r.l., Италия

Hyalobarrier gel® може да се закупи без рецепта от всяка аптека по предварителна заявка (за справка Инфофарма, раздел "Медицински изделия") или чрез вносителя за България – Новус ЕООД

NORDIC  
PHARMA

Вносител за България: **Новус ЕООД**  
София 1463, ПК 147, тел: +359 888912674, office@novus.bg, www.novus.bg

[www.srastvania.bg](http://www.srastvania.bg)

## Предстои ли ви гинекологична операция?



**Hyalobarrier® gel**  
превенция на образуването на постоперативни сраствания

Посъветвайте се с Вашия лекар

[www.srastvania.bg](http://www.srastvania.bg)