

КАЛКУЛАЦИЯ НА РИСКА ОТ СРАСТВАНИЯ ДИСКУСИЯ И КОМЕНТАРИ

• Предложени теми за дискусия

- При тази предварителна версия мин/макс възможни резултати са 4 и 43
 - Отразява ли тази десетократна оценителна система разликата между риска при най-благоприятния и най-неблагоприятния вариант?
 - Трябва ли тежестта на критерия "Вид и място на хирургията (SCAR-2 класификация)" да бъде преразгледана, това позволява максимална тежест > 4 да се отрази на същественния риск от сраствания, който съществува толкова реално когато има хирургична интервенция?
- Кои резултати да се приемат като граници за нисък/среден/висок риск?
- С оглед на превенцията на срастванията, какво значение има нивото на риска?
 - Висок риск: задържителна употреба на антиадхезивен продукт
 - Среден риск: употребата на антиадхезивен продукт следва да се обсъди
 - Висок риск: не се налага употребата на антиадхезивен продукт

Целта на дискусията е била да се определи окончателна версия на калкулацията на риска от сраствания

БЪДЕЩЕ

- Целта е оценъчната система за риска от сраствания на ANGEL експертната група да е достъпна до всички гинеколози-хирурзи в Европа
 - Достъпна на ESGE/ANGEL интернет сайта
 - Версия на хартия да бъде разпространена от NORDIC PHARMA
 - В бъдеще се предвижда да се разработи електронен калкулатор на риска от сраствания (наличен на интернет сайта + приложение за телефони/таблети).

ANti-adhesions in Gynecology Expert panel

NORDIC
PHARMA



Експертен панел против срастванията в гинекологията

Практическа калкулация оценката риска от сраствания (предварителна версия) : Презентация Professor P. Lundorff

ANGEL

ANti-adhesions in Gynecology Expert panel

Експертен панел против срастванията в гинекологията
С подкрепата на НОРДИК ФАРМА.

NORDIC
PHARMA

ЦЕЛ

- Да осигури практическо ръководство за бърза оценка на риска от сраствания, приложимо в ежедневната практика на гинеколозите-хирурзи

Ръководството за оценка риска от сраствания, би било от полза и за всички лекари, тъй като до момента няма такова ръководство или калкулатор за оценяване на риска от сраствания и съответно информирането на пациента за това

МЕТОДИ

- Литературни обзори за определяне на рисковите фактори за сраствания в гинекологичната хирургия
- Създаване на таблица с идентифицираните рискови фактори
- Разпространяване на таблицата с рискови фактори сред всички членове на ANGEL групата, които ги класират според тяхната тежест с оценка от 1 до 4

Ръководството за оценка риска от сраствания е творение на ANGEL експертната група

КАЛКУЛАЦИЯ НА РИСКА ОТ СРАСТВАНИЯ ДИСКУСИЯ И КОМЕНТАРИ

- Пълната оценка риска от сраствания включва постоперативни и 5 периоперативни рискови фактори, които са неизвестни преди операцията

Интраоперативни рискови фактори	Кървене	<100ml	1
		>500ml	4
	Екссесивна коагулация с тъканна некроза		3
	Локално изсъхване на тъканите		3
	Мезотелиална хипоксия		2
Постоперативни рискови фактори	Мезотелиално абразии		3
	Постоперативни усложнения (фистули, абсцеси, интраперитонеално кървене)		4

- Модифицират ли тези фактори, възникващи само по време на операцията резултатът от калкулацията на риска от сраствания (ако да в каква степен – от слабо до средно и/или от средно към високо) и по-нататък какво би било решението за превенция?

Допълнение: резултат преди операцията показващ среден риск + кървене > 500 ml (или екссесивна коагулация и т.н.) = висок риск

ANti-adhesions in Gynecology Expert panel

NORDIC
PHARMA

КАЛКУЛАЦИЯ ОТ РИСКА НА СРАСТВАНИЯ

Прегоперативни рискови фактори	Абдоминална/тазова операция в миналото	1	3
		> 1 or >2	4
	Данни за постоперативни сраствания		4
	Добавено коремно или гинекологично възпаление		4
	Ендометриоза		4
	Рак		
		Гинекологичен	2
		Негинекологичен	2
		Локален	3
		Метастатичен	2
	Химиотерапия		2
	Лъчелечение	Локално	4
		Далечно	1
Едновременна инфекция	Интраабдоминална	3	
	Друга	2	
Интраоперативни рискови фактори	Кървене	<100 ml	1
		>500 ml	4
	Продължителност на операцията	<60 min	2
		60 min to 2 hours	3
		>2 hours	4
		Сложност на операцията или обхват на хирургията	
	Екссесивна коагулация с тъканна некроза		3
	Вид и място на хирургията (SCAR-2 класификация)	Лапароскопска/Фалопиеви тръби	1
		Лапаротомична/Матка	2
		Лапаротомична/ Фалопиеви тръби	2
		Лапароскопска/Агхезиолиза	3
		Лапароскопска/Всички останали	3
		Лапаротомична/Яйчник	4
	Интра абдоминални чужди тела		2
	Локално изсъхване на тъканите		3
	Мезотелиална хипоксия		2
	Мезотелиално абразии		3
	Използване на електроскалпел		2
	Перитонизация		1
	Постоперативни рискови фактори	Постоперативни усложнения (фистули, абсцеси, интраперитонеално кървене)	
	ОБЩО		